



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



+28/2/5+

Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



+44/2/33+

Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣


A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{\bar{B}}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

**Question 3 ♣**

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



QCM

CC1-IAE-L2

**Contrôle Continu du Lundi
29 Septembre 2014**

Numéro d'anonymat (ou nom et prénom si
l'épreuve n'est pas anonyme) :

.....

Seule l'utilisation de calculatrices non graphiques est autorisée.

Ce sujet est composée de deux parties, la première partie est un exercice à rédiger sur votre copie, la seconde partie est un QCM à remplir sur le sujet qui sera donc remis avec la copie.

*Pour chaque item du QCM, une ou plusieurs réponses sont correctes, les bonnes réponses seront identifiées en **noircissant** la case correspondante. Aucune rature n'est permise dans les réponses du QCM. En cas d'erreur, précisez la réponse en la réécrivant complètement sur la copie.*

Exercice 1

Un employé se rend à son travail. Si l'employé est à l'heure un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{5}$, s'il est en retard un jour donné, la probabilité qu'il soit en retard le lendemain est $\frac{1}{20}$. Pour tout entier naturel non nul n , on appelle R_n l'évènement : «l'employé est en retard le jour n ». On note p_n la probabilité de R_n et on suppose que $p_1 = 0$.

1. Démontrez que $p_{n+1} = \frac{1}{5} - \frac{3}{20}p_n$.
2. En utilisant la suite $v_n = p_n - \frac{4}{23}$ déterminez l'expression de p_n en fonction de n .
3. Calculez la limite de la suite p_n .

Question 1 ♣

A et B désignent des évènements quelconques.

- ☐ $P_A(\bar{A}) = 0$
- ☐ $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- ☐ $P_B(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_B(\bar{A})$
- ☐ $P_{A \cap B}(A \cup B) = 1$
- ☐ $P_{A \cap B}(A) = 1$
- ☐ $P_B(A) = P_A(B)$
- ☐ $P_B(A) = 1 - P_{\bar{B}}(A)$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 2 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu.

- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 224.
- ☐ Le nombre total de mains comptant quatre cartes de même valeur est 896.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est 1512.
- ☐ Le nombre total de mains comptant exactement trois reines est $\binom{4}{3}$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 3 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 4
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 + A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} \times \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $A_4^3 \times A_4^3$
- ☐ Le nombre total de mains comptant trois as et deux rois est $\binom{4}{3} + \binom{4}{2}$
- ☐ Le nombre total de mains comptant toutes les cartes de la même couleur est 56
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣

On s'intéresse à un jeu de 32 cartes ordinaires. On appelle main un ensemble de 5 cartes issues de ce jeu. On appelle couleur la couleur pique, ou cœur, ou trèfle, ou carreau.

- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{5} + 4\binom{28}{4}$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains comptant au maximum un as est $\binom{28}{4} \times 28$
- ☐ Le nombre total de mains ayant au moins une carte de chaque couleur est $8^4 \times 14$
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣

Une compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens, et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , et 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30.

- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule des probabilités totales.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 23%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.175.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est d'environ 95%.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année se calcule à l'aide de la formule de Baye.
- ☐ Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, alors la probabilité qu'il soit un bon risque est $0,95 \times 0,2$.
- ☐ La probabilité qu'une personne choisie au hasard dans la population ait un accident dans l'année est égale à 0.5.
- ☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.